

西醫
百通
腦脊髓神經科之病理與療法

第一章 腦及腦膜等之疾病

一、流行性腦脊髓膜炎

原因 流行性腦脊髓膜炎，是從西洋醫學家魂希嘉巴謨氏所發明的名爲「細胞內重球菌」的細菌發生的。這種黴菌，依着某種動機，從鼻和咽頭等處，侵入人體中間，達到腦膜，便要在軟腦膜上，發生炎症，流出膿性肥皂汁狀的滲出物；其次，脊髓膜上也起相同的變化；腦室中間，也積蓄腦性液。這種細菌，多數是存在細胞中間，所以有一細胞內重球

菌」之名。

本病是小兒病的一種，有八〇%是十歲以下小兒發生的，二五%是哺乳兒發生的。本病多是在衆人聚集之處流行的。

症狀 本病多是一二日的前驅期的，在前驅期間，有全身違和，身心不安，惡寒，輕度的頭痛，頸痛，四肢上牽引性疼痛等症狀。此等症狀，大約要繼續着經過二十四以至四十小時；其後，又發生急劇的頭痛，眩暈，嘔吐，厭惡聲光，惡寒戰慄等症狀；在小兒方面，並且有發生痙攣的事情。病人身心不安，不能睡眠；但是，在一二日間，意識尙明瞭（惡性的病症，初起便意識混淆）；頭被牽引到後方，頸部有劇烈的疼痛。初起的時候，全身發熱不過攝氏二十九度；到了後來，却升到四十度左右。有的

病症；却只有輕的發熱。其次，頭痛更加劇烈；頸、背、四肢等處的筋肉，全現出僵直的狀態；頭部向後屈曲，和軀幹成直角。脊柱曲向前方成爲弓狀；極弱小的嬰兒，到了這個時候，往往頭和臀部相離不遠。用手接觸皮膚和筋肉，便要感覺劇烈的疼痛；發出譫語，意識完全溷濁。

療法 發生本病的時期，多是在冬春二季；炎暑之際，却也有發生本病的事情。本病是一種流行病，所以對於本病，須要先講究預防法。預防的方法，第一要使病人和健康的隔離。已經得着本病之後，須要用腰椎穿刺法，排除腦脊髓液。

預防法 本病是從鼻和咽頭侵入體內的，所以要慎防感冒風寒，以免發生鼻「加答兒」和咽頭「加答兒」等病症。鼻腔受着外傷，也是很

危險的事情，應當注意預防。本病是要由醫師治療的，所以疑心發生本病的時候，須要速請醫師診治。

二．腦膜炎

發生腦膜炎的人，多是小兒，所以本病也可稱為小兒病。中醫把腦膜炎稱為急驚風，和慢驚風。大人發生此病的事情很少。小兒發生的腦膜炎，是有流行性或是散在性的。大人發生腦膜炎的原因，除了外傷和耳病之外，其餘多是繼續着流行性腦脊髓膜炎或是結核病發生的；從結核病發生的病症，名為結核性腦膜炎。

原因 腦膜炎的原因頗多；主要的原因可以列舉如下：(一)結核，(二)黴毒，(三)魏克綏巴謨氏菌，(四)肺炎菌，(五)傷寒菌及諸種傳染

病菌，(六)外傷及微細之創傷，(七)從別種病症轉移而來。

在腦膜炎的種種原因之中，最多的是結核性腦膜炎。本病有原發性和續發性的區別；續發性的病症，是先在別處有結核病灶，從此發生腦膜炎；在結核性腦膜炎中間，這種最多。

結核性腦膜炎，是喜歡侵犯小兒的；據西洋醫學家統計，每八百八十六名有結核病的小兒，却有二六%個腦膜炎。每八百六十四名有結核病的大人，只有八%個結核性腦膜炎。照着這樣看來，可見腦膜炎是小兒的特殊疾病，它的性質全是有結核性的。

症狀 腦膜炎的一般的症狀，是先有刺戟症狀，後有麻痺症狀。它的顯明的症狀，是頭痛、眩暈、嘔吐、惡寒、發熱、精神昏迷、喃喃譫語、四肢攣