

# 中西醫藥指導

吳江蘇編

## 第一編 醫學指導

### (甲) 神經系病症狀與治療

#### (一) 腦卒中

其症狀以頭痛眩暈為前兆，亦有否者，忽然猝倒，不省人事，脈遲緩，發軀聲，顏面歪斜，口開流涎，瞳孔反射消失，大小便失禁，半身不遂，大多死亡，幸而不死，必遺半身不遂，耳聾，盲目等種種廢疾。其原因大多於四十歲以上動脈硬變之人，肥胖者，嗜飲酒者，梅毒，外傷等，皆為本病原因，本病即腦出血。治療方法，速解衣帶，移於空氣新鮮之地，高舉頭部，用冰罨法，若強壯

多血，脈博佳良，顏面呈紫色者，治法，二百至四百公分之血，但不宜，外用強心興奮等藥。

#### (二) 腦充血

此症有實性與虛性之別，實性者頭面灼熱，潮紅，耳鳴，結膜充血，瞳孔縮小，眼花閃發，脈博疾速強實，頭痛譫語，搖蕩瘳擊。虛性者，則頭痛耳鳴，眼花閃發，但無顏面潮紅，結膜充血等症象，而皮膚作蒼冷。考其原因，實性者即積血，因心悸，腦及軟腦膜炎，營養不良，暴飲，胃病，血行障礙等而起。虛性者即鬱血，因肺疾，患心疾，患咽喉狹窄，腦血管交感神經麻痺等而起。治療

之法，須根治原因，禁茶酒咖啡，戒房事及身心過勞，整理便通，症候裏者，高舉頭部，使其安臥，病室須稍暗，頭部心窩部行冰罨法，或行瀉血法，溫包四肢，投峻下劑，或灌腸。

### (三) 腦貧血

其症狀皮膚蒼白，惡心，嘔吐，冷汗，頭痛，眩暈，耳鳴，失神，搖擗，眼花閃發，其原因急性者由於大出血或精神感動，慢性者由於營養不良，及常習下痢。治療方法，急性者低其頭部，高其下肢，解衣使臥，以冷水灌注頭部及胸部，嗅以氣水，飲以酒類，慢性者除其原因，然後可恢復其血量。

### (四) 腦膜炎

此症有結核性與單純性之分，結核性者之症狀，為倦怠，不思食，反覆發熱，經三日後，頭痛，嘔吐，倦怠，發熱，嗜眠，舌苔，便閉，一星期後，呻吟，脈遲而下正，更進則起斜視，牙關緊急，項部反張，瞳孔左右不同，反應減少，腹部舟狀凹陷，同時弱脈癱瘓，麻痺昏睡而死。單純性者之症狀，則為寒戰發熱，頭痛眩暈，昏瞶嘔吐，牙關緊急，脈不正而徐遲，搖擗癱瘓，其經過期至多七日。其原因（一）由於結核性（二）由於外傷，丹毒，肺炎，傷寒，膿毒症，等重病之移轉。治療方法，病室須靜而暗，用冰罨法，擦水銀軟膏，內服金雞納及缺心鉀，急性症減退後，用強壯劑對症療法，參看癩痢條。

### (五) 腦腫瘍

其症狀眩暈，頭痛，嘔吐，昏蒙，脈緩，癱瘓，或半身不遂，或單麻痺，或起失語症，或多發性腦神經麻痺，或起強迫運動等障礙。其原因或不明，或由於結核，梅毒，外傷，包蟲，囊蟲等而起。治療方法，梅毒性者，六〇六注射，或用水銀劑，碘劑，他種瀉亦有，用碘劑各主，表面者可手術，頭痛用阿司匹靈，嘔吐擦攪用嗎啡。

### (六) 麻痺

其症狀全身或半身，或局部，肌肉運動廢止，患部厥冷，脂變萎縮。凡腦脊髓系之栓塞，血栓，腫瘍，軟化，脊髓硬結，反射刺激，神經壓迫，頭骨疾病，鉛中毒，出血，感冒，梅毒，傷寒，皆為本病原因。治療方法，除去原因，行溫水浴，蒸氣浴，或冷水淋浴，此外電治法，按摩法，及內服或注射番

木醣鹼。

### (七) 癩癩

此症發作時，全身癱瘓，猝倒，不省人事，面赤，噴沫，曠散，發作後熟睡，往往面貌遲鈍，精神減退，發作中死者少，然會治甚難。其原因由於遺傳，過勞，恐怖，腸蟲，腦病，梅毒，腦脊髓疾病等，而發本症。治療方法，須力避發作之誘因，勿過勞，發作時防其外傷，解其衣服，以布片嵌入齒列間，防傷舌，平常注意原因療法，服巽化鉀等鎮靜劑。

### (八) 振鎮麻痺

其症狀最初右手，次則四肢隨意肌運動減損，起振顫運動，肌肉強硬，顏貌不變，頭部前傾，

肢體強硬，且呈特異之步行狀態。此症大概發於四十歲以上，其原因由於脊髓病，神經損傷，精神感動，大傷感冒，傷寒，卒中，皆為本病原因，故治療時須注意原因，此外可用電氣療法。

### (九) 神經衰弱

其症狀為頭重頭痛，懷疑，健忘，情意易變，畏怯無力，甚至不眠，大便閉結，容易疲勞，食欲缺乏，本症雖不至死，然甚頑固。其原因由於性情之刺激，身體精神之過勞，烟酒之嗜好，皆為本病原因。治療方法，減少精神作業，轉地至海濱或高山，全身用按摩法及電治，冷水摩擦，略事運轉，選用而養品，間用溴素劑，注射司保命(Spermin)

### (十) 偏風

其症狀耳鳴，眩暈，眼花閃發，繼以偏側頭痛，對於光與聲銳感，惡心嘔吐，瞳孔縮小，患側頭部潮紅。其原因由於遺傳，神經衰弱，子宮病，貧血，悲哀，憤怒，瘧疾等為原因。治療方法，除原因避興奮，發作時居於暗室，頭部擦薄荷油，內服水楊酸劑，咖啡鹼，溴化鉀等，此外用感傳電氣並用腳浴。

### (十一) 脊髓癆

其症狀可分三步驟：(1)神經痛期，下肢痛如椎刺，腰脊狹窄，膝蓋髓反射消失，反射性瞳孔強直，(2)運動不整期，步行困難，兩便失禁，令病人閉自直立，則身體搖動，觸覺與痛覺遲

鈍，膀胱炎。(3) 截瘻期，陰萎，下肢麻痺，呼吸困難，漸次衰弱，腦脊髓液內，淋巴球增多。其原因梅毒爲主，餘如過勞，外傷，中毒等，亦有患本病者。治療方法，如爲梅毒者，施驅梅毒療法，安逸身心，靜臥，內服碘劑，用按摩，電治，溫浴等法，劇痛者用麻醉劑。

### (十二) 臟躁病

其症狀(1) 精神變化，喜怒哀樂無定。(2) 視野縮小，弱視，黑內障，耳聾，耳鳴，嗅覺異常。(3) 知覺障礙，或脫失，或過敏，神經痛。(4) 運動障礙，或麻痺，或痙攣，此外惡心嘔吐，吞酸，嘈雜，噯氣等。其原因以遺傳爲多，或由於子宮病，中毒等，患此症者，以婦女爲多。治療方法，礦泉浴，冷水浴，電療，發時服穿心排草酞及溴化鉀。

### (乙) 循環系病之症狀及治療

療

#### (一) 心囊炎

此症有數種，其症狀各別，茲略述如下。(A) 乾性心囊炎，其症狀爲(一)間或在胸骨左側觸知摩擦音。(二)胸骨上部聽摩擦音。(B) 滲出性心囊炎，其症狀爲(一)病人不安，常換體位。(二)皮略呈紫藍色。(三)都呼吸困難。(四)隣部肺臟，稍壓迫時，打響低朗，強壓，發半濁鼓音，滲出倫多量，可聽費氏氣管音。(五)胸廓富彈力，心部隆氣，心尖搏動初雖廣，但向左下方壓抵時則弱。(六)心音皆微弱。(七)脈常洪大，但心力衰時則小而數。(八)肝下葉向下方壓