

# 草藥新纂

張若靄編

## 上編 草藥形性

### 強壯藥

#### ■平地木 (老勿大)

平地木。生於山地。常綠樹。高不盈尺。葉卵形而厚。夏日開淡紅色小花。結實如梧子大。至冬紅赤。下綴可觀。入藥莖葉根實並用。

【功用】爲強壯藥。治虛勞盜汗。咯血。

【用量及服法】鮮用一兩至一兩五錢。乾用二錢至五錢。加糖適宜。水煎服。

#### ■虎刺 (引線包)

虎刺。生於高原。常綠樹。長尺餘。葉端有刺。冬月結實。細小赤色。入藥莖葉並用。

【功用】爲強壯藥。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。乾用二錢至六錢。水煎服。

■ 郁李皮

郁李，觀賞植物。高四五尺。葉廣披針形。有鋸齒。花小五出。淡紅色。結實小而圓。熟則紫色。入藥用根皮。

【功用】作補藥。開胃。

【用量及服法】乾用二錢至五錢。水煎服。

■ 野菊花

野菊。生於山野。多年草。莖多分枝。高三四尺。葉如菊葉相似。但比菊較小。有深缺刻。及細鋸齒。秋晚開花黃色。亦比菊較小。單瓣。入藥用葉及花。

【功用】花能健胃。葉可治疔癤。

【用量及用法】花。每用一錢五分至二錢。水煎服。採葉數十片。搗敷疔癤。

■黃精 (山搗白)

黃精。生於山野間。莖高二尺餘。葉如竹葉而短。花如風鈴。淡綠色。根如萎蕤。有節。節狀如白。可蒸而乾藏之。

【功用】作強壯藥。

【用量及服法】不拘多少。蒸熟頻服。

■荷包草

荷包草。生於山野。宿根。二月抽苗。其葉形如荷包。秋時開黃色小花。結實灰褐色。入藥根葉並用。

【功用】治勞損。吐血下血。

【用量及服法】鮮用一二兩。水煎服。

■魚鱉草

魚鱉草。生於巖石陰間。不易採取。葉一長一圓。俗稱長則為魚。圓則為鱉。入藥莖

葉並用。

【功用】治虛勞咳嗽。

【用量及服法】乾用二三錢。水煎服。

### ■南五味子

南五味子。生於山野。常綠蔓生植物。能纏繞於他物上。木質含有許多粘液。葉革質。長卵形而厚。有光澤。夏月開花。花小白。或淡黃色。有細梗約寸餘。生於葉液。果實自赤色之小球集合而成。入藥用果實。

【功用】作強壯藥。治久欬。

【用量及服法】每用三五錢。水煎服。

### ■竹節人參

竹節人參。多年草。生於山地。春日抽芽。三年後。莖高二三尺。其根與竹根相似。故名。葉掌狀複葉。一柄有三五小葉。花細小。白色。實大如小豆。赤色。入藥用根。