

陽明病篇（續）

○梔子厚朴湯

傷寒論曰

傷寒下後，心煩腹滿，臥起不安者，梔子厚朴湯主之。

梔子治煩及起臥不安，枳朴則治腹滿，此病起於傷寒下後，此心煩腹滿，起臥不安，是否由下劑引起，不無可疑，下劑如巴豆毒能引起腸炎，反射於大腸而成虛性興奮，則或有心煩起臥不安之症，腹滿或腸炎也，今以梔子治心煩起臥不安，枳朴治腹滿，或謂原方應有香豉，可從。

子厚朴湯方

梔子十四個

厚朴四兩炙去皮

枳實四枚水浸炙令黃

右三味，以水差升半，煮取一升半，去滓，分二服，溫澀一服，得吐者，止後服。

前賢治驗

葉氏曰津久辨尋又野村，井上與兵衛，患黃疸數月，東京淺田氏療之不效，其體虛硬滿，呼吸迫促，體身黃黑色，若臥則難起，晝夜臥起不止，予以梔子厚朴湯，加苳，兼

梔子厚朴湯

厚朴生薑半夏甘草人參湯

二

費丸互用之，不日胸腹頓滿即減，益投前方，病勢益減，卅餘日，病減半，更與前方不止，百餘日，全愈，感謝不已。

(按)腹硬滿，則此病既有腹水矣，上壓心臟而呼吸迫促，此病似為肝實質變症，但其色應紅黃，今則黃黑，或兼瘀血性，或閉塞性黃疸乎。

○厚朴生羌半夏甘草人參湯

傷寒論曰

發汗，腹脹滿者，厚朴生羌半夏甘草人參湯主之。

發汗後，腹脹滿，腹脹滿為腸炎，由於腸內容物發酵化氣，腸粘膜炎充血或腸肌弛緩也，此病似與發汗無關，但因過汗而致衰疲者則有關，厚朴生羌半夏甘草人參湯，為慢性衰疲性腸炎之妙方，人參可以興奮腸肌，厚朴生羌半夏可以解腸肌之痙攣制止發酵，並改良其粘膜血液循環，奏消痰之效，甘草緩和包攝劑。

厚朴生薑半夏甘草人參湯方

厚樸半斤灸去瘦

用薑半斤切

半夏半斤洗

甘草二兩灸

人參一兩

若五味，以水一斗，煮取麥升，去滓，溫服一升，日三服。

○桃核承氣湯

論百

大陽病，不解，熱結膀胱，其人如狂，血自下，下者愈，其外不解者，尙未可攻，當先解外，外解已，但少腹急結者，乃可攻之，宜桃核承氣湯。

十一陽病，不解，即惡寒發熱不解，熱結膀胱，謂其熱結於膀胱也，古人稱少腹部位爲膀胱，非今日解剖學上之膀胱，其人如狂，爲腦神經中毒，若血自下則能自愈，蓋毒隨血下而滅，且血液既下，腦充血可解，皆於病機有利（血自下猶西醫之放血）。

此病若外症未除，則當先解外，不可攻下，此爲仲聖先表後裏之治法，外症既解，而惟少腹急結者（即少腹結痛爲迴胃部有積糞及充血腫脹）乃可攻之，以消其充血腫脹及去其腸內積穢，此種治法可用於腸炎初期，若腸壁扶斯第叁星期則萬萬不可用，蓋攻下難引起患部出血，及腸穿孔，讀古醫者，不可死於句下，否則，殺人於反掌間矣。桃核承氣湯即調胃承氣湯加桃仁桂枝者，桃仁中醫謂有破血作用，每用於出血充血之症，但其理不明，西醫則謂有多少鎮靜止痛作用，桂枝亦能鎮靜止痛，然則此湯爲鎮靜兼瀉下劑乎，湯本氏神乎其說，然余未敢苟同也。（下劑得鎮靜劑協助，其力更大）

桃核承氣湯方

桃仁五十個去皮尖

大黃四兩

桂枝二兩去皮

桃核承氣湯

三

桃核承氣湯

四

甘草二兩炙 芒消二兩

右五味以水七升，煮取二升半，去滓，內芒消，更上火微沸，下火，先食，溫服五合，日三服，當微利。

前賢治驗

醫史撰華生傳曰：馬萬戶妻，體肥氣盛，因無子，屢緩子宮藥，積久火甚，適血上行而燒腸，每動必致研，面赤脈躁疾，神恍如痴，醫者猶以爲上盛下虛，治以丹劑鎮壓之，滑壽曰：經云上者下之，今血氣俱盛，溢而上行，法當下導，奈何可實實耶，即與桃仁承氣湯，下積瘀三四次，繼服既濟湯甘離而愈。

醫隱辨疑曰：豈可患痢疾，痛而急迫，其所下者皆黃黑色，與醫以藜苓湯，待用枳殼置蓮，其患愈劇，因請余治，診脈兩尺脈緊而滑，知寒傷榮也，細問之，婦答曰：行經時，飲冰水一碗，遂得此證，（中略）遂用桃仁承氣湯，內加馬鞭草玄胡索，一服後，次早下黑血數升許，痛止膿清，次用調脾活血之劑，其患悉痊，今後治痢不可不察焉。

續錄曰：一男子，年六十五，喘息咳嗽，不覺安劑，已數十年，近時身熱，或休或作，數日不愈，遂吐痰血，一日齒縫出血，連綿不止，其色點如絮，以手引之或三尺或三四尺，劇時耳鼻悉出血，大便亦下血，如是三日夜，絕穀好飲，有精神。如無病然，平